



SCHEDA DI SCREENING INGRESSO

ANNO
n. prog.
scheda

PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

Scheda redatta sulla scorta dei contenuti del Rapporto ISS COVID-58/2020 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARC-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA (aggiornato al 28 AGOSTO 2020). Chiediamo di rispondere alle seguenti domande:

DATI ANAGRAFICI

Cognome(*) _____ Nome (*) _____

Contatto telefonico (*) _____

Temperatura corporea rilevata in ingresso TC (*) _____ < 37,5°C

(*) CAMPI OBBLIGATORI

Ha avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto (*) con una persona con diagnosi sospetta o confermata di infezione da coronavirus (COVID-19)?

SI

NO

Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi?

- febbre
- tosse secca
- respiro affannoso/difficoltà respiratorie
- dolori muscolari diffusi
- mal di testa
- raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola)
- mal di gola
- congiuntivite
- diarrea
- vomito

Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all'Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Data _____ Firma _____

AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO ALLA SCUOLA

SI AUTORIZZA

NON SI AUTORIZZA

PERSONA
FISICA

l'ingresso della/del Sig.ra/Sig _____

per l'alunno _____

grado di parentela _____

in considerazione dell'eccezionalità della situazione e dopo aver fornito le indicazioni sulle norme comportamentali e sulle precauzioni raccomandate per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

FORNITORE
E/O

MANUTENTORE

l'ingresso della/del Sig.ra/Sig _____

della ditta _____

in considerazione dell'eccezionalità della situazione e dopo aver fornito le indicazioni sulle norme comportamentali e sulle precauzioni raccomandate per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Data _____ La Scuola (l'addetto al Triage) _____

COMPORAMENTI DA ADOTTARE IN SCUOLA

Le ricordiamo di attenersi alle seguenti norme comportamentali e di adottare le precauzioni raccomandate per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, in particolare:

- mantenersi a distanza di 1 metro;
- evitare strette di mano, baci e abbracci;
- effettuare l'igiene delle mani con acqua e sapone e asciugatura con salvietta monouso o frizione con soluzione idroalcolica;
- tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito poi effettuare igiene delle mani con acqua e detergente o con soluzione idroalcolica; i fazzoletti dovrebbero essere preferibilmente di carta e dovrebbero essere smaltiti in una pattumiera chiusa;
- evitare di condividere oggetti con il suo congiunto e/o altri residenti, come asciugamani, salviette e lenzuola, piatti, bicchieri, posate, etc;
- se la sua permanenza è prolungata è necessario lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o frizionarle con soluzione idroalcolica;
- se sente l'esigenza di toccarsi la bocca, il naso o gli occhi lavarsi prima e dopo

* * *

(*) DEFINIZIONE DI "CONTATTO STRETTO" ai sensi dell'Allegato 1 alla circolare 6360 del 27 febbraio 2020

- persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri
- operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, a un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia del caso in esame.